

CONTROL D'INFECCIONS ALS CENTRES SANITARIS



Infecció de localització quirúrgica

És una infecció que apareix a la ferida quirúrgica (superficial, profunda o d'òrgan/espai).

Apareix habitualment dins dels 30 dies postquirúrgics i en cirurgia protètica fins als 90 dies.

Factors de risc

- Profilaxi incorrecta.
- Temps quirúrgic prolongat.
- Diabetis, obesitat, immunodepressió.

Sabies que...

La **infecció de ferida quirúrgica** és la principal causa d'infecció nosocomial en pacients quirúrgics.

Com ens pots ajudar?

Abans de la cirurgia

- 👉 Dutxa't correctament segons les indicacions (sabó antisèptic si s'indica).
- 🚭 Deixa de fumar abans de la intervenció.
- 💡 Informa de totes les malalties i medicació habitual.
- 🩸 Controla malalties cròniques (diabetis, obesitat...).
- 🚫 No t'afeitis la zona quirúrgica a casa.

Després de la cirurgia

- 👉 Renta't les mans abans de tocar la ferida.
- 🩹 Mantén la ferida neta i seca.
- ❌ No manipulis ni retiris apòsits sense indicació.
- 👁️ Vigila signes d'infecció (envermelliment, dolor, pus, febre...).
- ☎️ Consulta ràpidament si apareixen símptomes.



CLÍNICA
TERRES DE L'EBRE
TORTOSA